Propagation d'incertitudes et étude de sensibilité dans les modèles d'atmosphères planétaires

Michel Dobrijevic

université
de **BORDEAUX**

Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux

L'atmosphère, un système complexe

Modélisation : différents types de modèles

Modèle météorologique ou climatique

Plus de physique

Modèle photochimique

Plus de chimie

Titan, un
satellite
remarquable !

Titan dans le visible (Cassini, NASA)

Titan : un satellite de Saturne (Cassini, NASA)

L'atmosphère de Titan

Atmosphère

Conditions à la surface

$P = 1.5 \text{ bar}$

$T = 93 \text{ K}$

Composition

Azote N_2 : 95%

Méthane CH_4 : 4.9%

Hydrogène H_2 : 0.1%

Gravité : 1.352 m.s^{-2}

Sarah M. Hörst

Titan : un réacteur chimique à l'échelle d'une planète

De nombreux composés condensent dans la basse atmosphère

Des aérosols sont produits chimiquement dans la haute atmosphère

Plusieurs mètres de HCN , C_2H_2 , C_6H_6 , etc. se sont accumulés à la surface !

Modélisation physique et chimique de l'atmosphère de Titan

Pour chaque espèce i , à chaque niveau d'altitude :

Abondance

$$\frac{dy_i}{dt} = \frac{P_i}{n} - y_i L_i - \frac{\text{div}(\vec{\Phi}_i)}{n}$$

Chimie

Transport vertical
(et horizontal)

+ autres processus
(condensation,
apports et pertes aux
limites,...)

180 espèces et 140 niveaux d'altitude (1200 réactions chimiques)

→ Environ **25 000** équations différentielles non-linéaires et couplées

La photo-chimie

Des centaines (voire des milliers) de réactions :

- Photodissociation : $A + h\nu \rightarrow B + C$
- Photoionisation : $A + h\nu \rightarrow A^+ + e^-$
- Réactions neutres : $A + B \rightarrow C + D$ (*)
- Réactions ions-neutres : $A^+ + B \rightarrow C^+ + D$
- Recombinaison dissociatives : $A^+ + e^- \rightarrow B + C$
- etc.

Les constantes de réaction sont mesurées en laboratoire ou calculées via des modèles théoriques

Chimie des composés azotés

Méthodologie répandue

Implicitement, la chimie est considérée connue,
mais pas tout le temps !?

Exemple

Abondances et étude de sensibilité locale

→ Comparaison entre les résultats du modèle et les observations

Des années de tentative de détermination du paramètre physique $K(z)$

A chaque nouvelle étude, on a une nouvelle détermination de ce paramètre physique...

Une chimie imprécise et mal connue

Incertitudes sur les données

- Des mesures très dispersées (expériences difficiles)
- Des mesures obtenues dans des conditions inadaptées (température, gaz porteur)

Informations manquantes

- Un grand nombre de réactions non étudiées
- Beaucoup d'espèces non étudiées (isomères, espèces lourdes, radicaux très réactifs)

Search Results

Kinetics Database

Click on a link in the table below to see detail on the selected reaction.

Records	Reaction
1 records matched	$\cdot\text{CH}_3 + \text{CH}_3\text{CO} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6 + \text{CO}$
119 records matched	$\cdot\text{CH}_3 + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$
1 records matched	$(\text{CH}_3)_3\text{Ga} + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6 + \cdot\text{CH}_3 + \text{CH}_3\text{Ga}$
2 records matched	$(\text{CH}_3)_4\text{Sn} + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6 + (\text{CH}_3)_3\text{Sn}$
1 records matched	$(\text{CH}_3)_2\text{Hg} + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6 + \cdot\text{CH}_3 + \text{Hg}$
1 records matched	$\text{C}_2\text{H}_6 + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6 + \cdot\text{CH}_3$
3 records matched	$\text{CH}_4 + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6 + \text{H}\cdot$
1 records matched	$\text{GaMe}_2\text{NH}_2 + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{GaNH}_2 + \text{C}_2\text{H}_6 + \cdot\text{CH}_3$

Search returned 129 records.

Plusieurs facteurs pouvant expliquer les différences

- Temperature
- Gaz porteur
- Technique utilisée
- Date des expériences (?)
- Expertise de l'équipe (?)
- etc.

⇒ Quelle constante choisir et comment ?

La dispersion est plus grande que les incertitudes !

Facteur 20 entre les mesures...
Quelle est la valeur nominale ?
Quel est le facteur d'incertitude ?

Comment extrapoler à basse température ?

Constantes de réaction à basse température

- La plupart des réactions sont mesurées à 300 K.
- L'extrapolation à basse température n'est pas triviale.

Exemple:
Mesure de $\text{CH} + \text{CH}_4$
à basse
température

Quels effets sur les modèles ?

Choix des réactions

→ On calcule les taux de production relatifs (et les taux de perte relatifs) de chaque espèce du modèle

Méthodologie

→ On fait varier chaque paramètre individuellement d'un certain facteur et on regarde son impact sur les résultats

Méthode “One-factor-at-a-time”

Etude de sensibilité locale

- Cette méthode ne donne qu'une information partielle...
Elle ne prend pas en compte la non-linéarité et les couplages du système !

Comment tenir compte du couplage des espèces
et de la non-linéarité et du système ?

$$\frac{d[X_1]}{dt} = f_1 ([X_1](t), [X_2](t), \dots, [X_n](t))$$

$$\frac{d[X_2]}{dt} = f_2 ([X_1](t), [X_2](t), \dots, [X_n](t))$$

...

$$\frac{d[X_n]}{dt} = f_n ([X_1](t), [X_2](t), \dots, [X_n](t))$$

→ En faisant varier tous les facteurs en même-temps !

Propagation des incertitudes sur les paramètres du modèle (facteurs d'entrée)

- Ce que l'on souhaite faire :
 - Tenir compte du caractère non linéaire et des couplages du système
 - Tenir compte des incertitudes sur les paramètres chimiques
 - Ajouter des processus pour lesquels nous n'avons que des estimations grossières

- Ce qu'il nous faut :
 - Une revue sérieuse de la chimie (par des spécialistes) avec une estimation des incertitudes pour toutes les constantes...
 - Des outils pour générer les entrées et analyser les sorties

Problème de l'incomplétude des schémas réactionnels

De nombreuses réactions et de nombreuses espèces ne sont pas introduits dans les modèles par manque d'informations !

Comment compléter les schémas réactionnels ?

1. On ajoute des réactions dont on ne sait pas grand chose (pas d'étude expérimentale, pas d'étude théorique poussée)
2. On regarde l'effet sur les résultats du modèle.
 - S'il y a un effet, il faut l'ajouter au système.
 - Sinon, on ne s'en occupe pas (?)

Attention :

- il faut tenir compte de l'incertitude de sa constante !
- Il faut tenir compte des couplages non-linéaires du système !

→ Une réaction peut être importante de manière subtile...

Mon expérience sur la détermination des facteurs clefs

Les principales méthodes utilisées :

- Analyse locale
- Graphes à transmission de signaux
- **Monte-Carlo**
- Plans d'expériences
- Latin Hyper-cube

Collaboration
avec l'équipe M²

Les graphes à transmission de signaux

Schéma réactionnel de 12 espèces et 48 réactions

Il y a 11 357 chemins
entre CH_4 et C_2H_4 !

→ Permet une étude
quantitative
exhaustive de tous les
chemins !

→ Impossible à
utiliser pour des
systèmes plus gros !!

12 nœuds et 75 branches (dont des boucles)

(Dobrijevic et al. 2010)

La méthode de sensibilité locale

Abondance de l'espèce i après modification de la réaction j .

Abondance de l'espèce i nominale

$$S_j^i = \frac{\log X_j^i - \log X_0^i}{\log F_j}$$

Coefficient de sensibilité de la réaction j sur l'espèce i .

Facteur d'incertitude de la réaction j .

→ A priori, toutes les réactions doivent être testées !

→ Les incertitudes en entrée doivent être faibles...

→ Echoue à donner les réactions clefs dans le bon ordre dans un cas général !

La méthode de propagation locale d'incertitudes

$$U_j^i = \frac{(\log F_j)^2 (S_j^i)^2}{\sum_j (\log F_j)^2 (S_j^i)^2}$$

Importance relative de la réaction j pour l'espèce i .

Coefficient de sensibilité de la réaction j sur l'espèce i .

Facteur d'incertitude de la réaction j .

→ Echoue à donner les réactions clefs dans le bon ordre pour les « gros » systèmes !

Une méthode globale : Monte-Carlo

Le principe est simple...

→ Entrée :

Le schéma réactionnel
- constantes de réaction recommandées sur des considérations expérimentales ou théoriques,
- estimations des facteurs d'incertitude de chaque réaction.

→ Sortie :

Distributions des abondances de chaque composé

...mais les temps de calculs sont importants

Générer des constantes de réaction aléatoirement

Variable aléatoire qui suit une distribution normale

$$\log(k_j) = \log(k_j^0) \pm \varepsilon \log(F_j)$$

Constante de la réaction j

Facteur d'incertitude de la constante de réaction j

↑
Rejet des valeurs > à 2σ

Exemple de résultat (1)

Profils des abondances en fonction de l'altitude

Exemple de résultat (2)

Profils des abondances en fonction de l'altitude

Distribution des abondances pour une altitude donnée

Calcul du facteur d'incertitude pour chaque altitude

Exemple de résultat (3)

Interprétation des résultats (2)

Il y a aussi des désaccords...

Bimodalités épistémiques

Des bimodalités apparaissent à cause de la mauvaise connaissance de certaines constantes réactionnelles !

(Dobrijevic et al. 2008)

Sensitivity Analysis highlights 2 key reactions:

Analyse de sensibilité globale

$$X_i = \overline{X_i} \pm \Delta X_i$$
$$X_i = \log(k_i)$$

$$Y_j = \overline{Y_j} \pm \Delta Y_j$$
$$Y_j = \log(y_j)$$

Détermination des **facteurs clefs** (constantes de réaction) responsables des larges incertitudes sur les sorties (abondances)

Coefficients de corrélation de rang de Spearman

Utilisé pour des variables dont la relation est non linéaire mais monotone

Coefficient de rang
de i avec j :

$$\rho_{i,j} = \frac{\text{COV}(r_{X_i}, r_{Y_j})}{\sigma_{X_i} \sigma_{Y_j}}$$

Coefficients de corrélation de rang de Spearman

Reaction	RCC		
	at 300 km	at 200 km	at 100 km
acetylene C ₂ H ₂			
C ₂ H + C ₂ H ₂ → C ₄ H ₂ + H	-0.23	-0.24	-0.24
H + C ₂ H ₂ + M → C ₂ H ₃ + M	-0.23		-0.30
C ₂ H ₃ + CH ₄ → C ₂ H ₄ + CH ₃			0.21
ethylene C ₂ H ₄			
H + C ₂ H ₂ + M → C ₂ H ₃ + M	0.32		0.27
H + C ₂ H ₄ + M → C ₂ H ₅ + M	-0.25	-0.23	-0.37
C ₂ H ₃ + CH ₄ → C ₂ H ₄ + CH ₃		0.49	0.59
ethane C ₂ H ₆			
¹ CH ₂ + CH ₄ → CH ₃ + CH ₃	0.33	0.33	0.32
H + C ₂ H ₂ + M → C ₂ H ₃ + M	-0.27		
CH ₃ + CH ₃ + M → C ₂ H ₆ + M	0.21	0.21	
CH ₃ + C ₂ H ₅ + M → C ₃ H ₈ + M	-0.31	-0.32	-0.32
C ₂ H ₃ + CH ₄ → C ₂ H ₄ + CH ₃		0.22	0.39
propyne CH ₃ C ₂ H			
H + C ₂ H ₂ + M → C ₂ H ₃ + M	0.42		0.25
H + C ₃ H ₃ + M → CH ₃ C ₂ H + M	0.48	0.57	0.45
H + CH ₃ C ₂ H + M → C ₃ H ₅ + M		-0.27	
C ₂ H ₃ + CH ₄ → C ₂ H ₄ + CH ₃			-0.37
propene C ₃ H ₆			
H + C ₃ H ₆ + M → C ₃ H ₇ + M	-0.50	-0.35	
H + C ₂ H ₂ + M → C ₂ H ₃ + M	0.31		0.32
H + C ₃ H ₅ + M → C ₃ H ₆ + M	0.33	0.25	
CH ₃ + C ₂ H ₃ + M → C ₃ H ₆ + M		0.51	0.35
CH ₃ + C ₂ H ₃ → C ₃ H ₅ + H		-0.21	
C ₂ H ₃ + CH ₄ → C ₂ H ₄ + CH ₃			-0.43
propane C ₃ H ₈			
C ₂ H + C ₃ H ₈ → C ₃ H ₇ + C ₂ H ₂	-0.20	-0.20	
CH ₃ + C ₂ H ₅ + M → C ₃ H ₈ + M	0.72	0.71	0.72
C ₂ H ₃ + CH ₄ → C ₂ H ₄ + CH ₃		0.24	0.45

RCC

Rank Correlation Coefficient

⇒ Les réactions qui ont un
RCC (en valeur absolue)
proche de 1 sont des
réactions clefs

De nouvelles mesures des constantes clefs améliorent le modèle !

Exemple: nouvelle évaluation de 38
constantes à basse température

CH + Réactants → Produits

C₂H + Réactants → Produits

C₄H + Réactants → Produits

CN + Réactants → Produits

⇒ La diminution des facteurs
d'incertitude des constantes clefs
permettent :

- de réduire les incertitudes sur les sorties
- de supprimer les bimodalités

(Dobrijevic et al. 2008a)

Détermination de schémas réduits

Méthodologie : pour un ensemble d'espèces données, on ne conserve que les réactions dont les RCCs sont importants !

Schéma réactionnel initial :

- 124 espèces
- 1313 réactions

Schéma réactionnel final :

- 22 espèces
- 57 réactions

⇒ Le modèle réduit est en accord avec le modèle “complet”

(Hue et al. 2015)

Utilisation des plans d'expérience

Méthodologie : Construction d'un méta-modèle et recherche des facteurs clefs

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots$$

(Dobrijevic et al. 2008b)

Utilisation des plans d'expérience

Sur des modèles simples

96 simulations

Key reactions determined by the experimental design

Compound	Key reactions (left: predominant; right: important)		Rank correlation coefficients for main reactions (5000 runs)	
			Reaction number	Rank correlation coefficients for C ₂ H ₂ (absolute value >0.1)
1: H ₂	R18; R19; R4	R31; R6; R17; R43; R73; R29		
2: H	R35; R18; R2; R17; R6; R73; R29	R37; R4; R31; R34		
3: CH ₄	R35; R4; R6; R73; R2; R19	R18; R17; R31		
4: CH ₃	R35; R18; R73	R19; R2; R4	R18	0.40
5: ³ CH ₂	R19	R43; R73	R35	-0.38
6: ¹ CH ₂	R18; R73	R6; R31; R19; R4	R6	0.34
7: CH	R29; R17	R19; R18; R3	R73	0.32
8: C ₂ H ₂	R18; R73; R29; R35; R17	R2; R6; R4; R10	R17	-0.27
9: C ₂ H	R58	R18; R7; R73; R29; R17; R35	R10	0.27
10: C ₂	R56	R8; R18; R29; R17	R4	0.25
11: C ₂ H ₃	R80; R22; R51		R29	0.20
12: C ₂ H ₄	R17; R29; R18	R2; R6; R26	R11	0.19
13: C ₂ H ₆	R87; R35	R73; R18; R19; R2; R4	R2	0.18
14: C	R17; R29	R19; R2; R26; R18	R31	-0.13
15: C ₂ H ₅	R87; R23; R39	R18; R35; R73; R19		

⇒ Les plans d'expériences donnent les bonnes réactions clefs (mais pas forcément dans le bon ordre)

(Dobrijevic et al. 2008b)

Conclusion

Ce dont j'ai besoin pour mes modélisations dépend de mes objectifs :

1. Avoir une bonne estimation des incertitudes sur les sorties du modèle2. Déterminer les facteurs clefs3. Rechercher des multi-modalités		• Parcourir tout l'espace des paramètres d'entrée du modèle ?• Utiliser une méthode "statistique" de type Monte-Carlo ?

Contrainte forte : le temps de calcul !

⇒ *Comment réduire le nombre de simulations ?*

⇒ *Comment déterminer la pertinence des facteurs clefs ?*

Une seule méthode pour tout faire ?